


Anfaldsobservation



- 1 Bevidsthed
- 2 Øjendrejning
- 3 Barnets kulør
- 4 Ændret sanseudtryk, lugt, lyde m.m.
- 5 Vejtrækning
- 6 Kramper
- 7 Uhensigtsmæssige bevægelser
- 8 Urin / afføring

Forvarsler:	Fald:	Afslutning:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Vi har lavet denne lille pjeces for at gøre det lettere for dig, der skal observere og beskrive anfaldet.

Man finder frem til, om børn har epilepsi ved hjælp af de observationer, som bliver gjort i forbindelse med anfaldet.

Derfor er det vigtigt at fortælle præcis, hvad man ser og oplever.

Disse observationer er det vigtigste redskab for lægen til at finde frem til den rette sygdom og den rette behandling. Beskriv derfor alt, hvad du ser, med dine egne ord.

Vejledning

Da et anfald ofte er en kaotisk og meget stressende oplevelse, er det en god idé at lave en systematisk anfaldsbeskrivelse for hvert anfald (brug blokken).

Anfald kan se meget forskellige ud. Derfor vil du i denne vejledning finde en beskrivelse af de fænomener, som kan optræde.

Indledning

Hvor længe varer anfaldet? Start uret



Forvarslers (prodromer):

Var der nogen forvarslers i tiden (timer/dage) op til anfaldet:

- Ændret opførsel?
- Ændret humør?

Ændret sansendeindtryk (aura):

Ændrede sansendeindtryk er i sig selv et anfald. Barnet kan opleve ting anderledes end det, der reelt sker:

- Anderledes synsindtryk
- Anderledes lugte
- Anderledes lyde
- Anderledes smagsoplevelser
- Føler ting anderledes

Fald:

Hvis barnet faldt, er det så:

- Som et bræt?
- Helt sløvt?
- Tager barnet fra for faldet?
- Slår barnet sig?

Udsigtsmæssige bevægelser (automatismer):

Hvis barnet faldt, er det så:

- Ting barnet gør under anfaldet, og som ikke kan forklares.
- Hyppigst som pillen, roden, blinken eller smasken.

Bevidsthed (vågenhed):

- Kan barnet svare på et stille spørgsmål?
- Kan barnet høre, men ikke tale?
- Kan anfaldet afbrydes?
- Kan barnet lyster på ordre (f.eks. se ud ad vinduet)?
- Ændrer det sig under anfaldet, hvordan og hvornår?

Øjendrejning:

Hvordan bevæger barnet øjnene under anfaldet:

- Opad?
- Mod højre?
- Mod venstre?
- Stirren
- Øjenkontakt?
- Lukkede øjne?

Kramper:

Har barnet kramper under anfaldet?

Hvordan ser de ud:

- Stivner barnet?
- Rykvisse trækninger?
- Omfatter kramperne hele kroppen?
- Omfatter kramperne få muskler?
- Ændrer barnet kulør?

Vejrtrækning:

Er vejrtrækningen:

- Hurtig?
- Stødvis?
- Ophørt i perioder?

Urin/afføring:

Er der vandladning eller afføring i forbindelse med anfaldet?

Afslutning

Hvordan har barnet det efter anfaldet?

Læg barnet om på siden, hvis det sover/hviler sig.

Hvis barnet er vågen

(svar på de næste spørgsmål):

Kan barnet umiddelbart genoptage sine gøremål fra før anfaldet?

Kan barnet huske anfaldet (hvad der blev sagt, gjort...)?

Reorientering: Hvor længe varer det, før barnet genvinder bevidstheden?

Lammelse: Har barnet umiddelbart efter anfaldet svært ved at bevæge hele eller dele af kroppen?

Træthed: Har barnet behov for at sove eller hvile sig efter anfaldet?

Tid: Hvor lang tid tog anfaldet? Hvad tid på døgnet fandt anfaldet sted?

Barnets oplevelse: Hvad mærkede barnet?